






REANIMATIE PROTOCOLLEN

Indicatie stelling		Shake and shout Controleer ademhaling Start BLS Reanimatie team oproepen	Indicatie stelling		Shake and shout Controleer ademhaling Start BLS Reanimatie team oproepen
Aankomst reanimatie team	Ritme controle	Bepaal shock/ non shock	Aankomst reanimatie team	Ritme controle	Bepaal shock/ non shock
		NON-SHOCK protocol			SHOCK protocol
Blok 1 (2 minuten)		Continueren BLS Zorg voor iv of io toegang Neem bloed af Start met doorlopen 4xH 4xT	Blok 1 (2 minuten)	1 ^e shock 	Start BLS Opladen defibrillator Defibrilleren 200 J
1 mg adrenaline					Continueren BLS Zorg voor iv of io toegang Neem bloed af Start met doorlopen 4xH 4xT
	Ritme controle			Ritme controle	
Blok 2 (2 minuten)		Continueren BLS 4xH en 4xT afronden Denk na over intubatie	Blok 2 (2 minuten)	2 ^e shock 	Continueren BLS Opladen defibrillator Defibrilleren 200J
	Ritme controle				Continueren BLS 4xH en 4xT afronden Denk na over intubatie
Blok 3 (2 minuten)		Continueren BLS Zorg voor eventuele hulp		Ritme controle	
1 mg adrenaline			Blok 3 (2 minuten)	3 ^e shock 	Continueren BLS Opladen defibrillator Defibrilleren 200 J
	Ritme controle		1 mg adrenaline 300 mg cordarone		Continueren BLS Zorg voor eventuele hulp
Blok 4 (2 minuten)		Continueren BLS Re-asses		Ritme controle	
			Blok 4 (2 minuten)	4 ^e shock 	Continueren BLS Opladen defibrillator Defibrilleren 200 J
					Continueren BLS Re-asses
				Ritme controle	
			Blok 5 (2 minuten)	5 ^e shock 	Continueren BLS Opladen defibrillator Defibrilleren 200 J
			1 mg adrenaline		Continueren BLS

4xH	4xT	
Hypoxie Hypovolemie Hypothermie Hyper/hypo elektrolyten	Trombo-embolisch Toxicologie Tension pneumothorax Tamponade	Hartmassage frequentie 100-120/min Diepte 5-6 cm Adrenaline herhalen om de 3-5 minuten